

じょうずに予防接種を受けるために・・・

予防接種を受ける前の注意

- ① 乳幼児期の予防接種は個人通知をしませんので、計画的に受けてください。
 - ② 母子手帳を必ずご持参ください。（忘れた場合は受けられません。）
 - ③ 対象年齢を過ぎてしまうと、任意の予防接種となり、自己責任・自己負担での接種となります。
 - ④ 「標準的な接種」の受け方で受けるようにしてください。
 - ⑤ 予防接種の受け方についてわからない場合は、役場 保健師（Tel46-1200）までお尋ねください。
- ※場所・・・県内の各医療機関（一部を除く） また、なるべく本人の状況等を把握したかかりつけ医等で接種してください。
- ※期間・・・年間を通して受けることができます。必ず事前に予約をして下さい。

定期予防接種の種類

詳細は町が配布した説明書「予防接種と子どもの健康」をご確認ください。

種類		標準的な接種	回数	接種できる年齢	他の予防接種までの間隔
ロ タ タ	ロタリックス (1価)	生後2か月～14週6日までの間（27日以上の間隔）	2回 経口接種	生後6週0日～24週0日までの間	制限なし
	ロタテック (5価)	生後2か月～14週6日までの間（27日以上の間隔）	3回 経口接種	生後6週0日～32週0日までの間	
ヒ ブ		生後2か月～7か月未満に開始し、生後12か月まで（27～56日の間隔）	初回3回	生後2～60か月未満 (5歳未満)	制限なし
		初回接種終了後7～13か月の間隔で接種	追加1回		
小 児 用 肺 炎 球 菌		生後2か月～7か月未満に開始し、生後12か月まで（27日以上の間隔）	初回3回	生後2～60か月未満 (5歳未満)	制限なし
		初回終了後60日以上の間隔をおいて生後12～15か月未満	追加1回		
四 種 混 合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ)		生後2か月～12か月未満（20～56日までの間隔）	1期初回 3回	生後2～90か月未満 (7歳6か月未満)	制限なし
		1期初回接種（3回）終了後12～18か月の間隔で接種	1期追加 1回		
B 型 肝 炎		生後2か月～9か月未満（27日以上の間隔）	初回2回	1歳未満	制限なし
		生後2か月～9か月未満（1回目終了後139日以上）	追加1回		
BCG		生後5か月～8か月未満	1回	1歳未満	注1
水 痘		【1回目】生後12か月～15か月未満	2回	生後12か月～36か月未満 (3歳未満)	注1
		【2回目】1回目接種終了後6か月～12か月までの間隔で接種			

種類	標準的な接種	回数	接種できる年齢	他の予防接種までの間隔
麻しん風しん混合(MR)	生後12か月～24か月未満(2歳未満)	1期1回	生後12か月～24か月未満(2歳未満)	注1
	小学校就学前の1年間	2期1回	小学校就学前の1年間	
日本脳炎	生後6か月～90か月未満(7歳6か月未満)	1期初回2回	3歳～4歳未満(6～28日までの間隔)	制限なし
		1期追加1回	4～5歳に達するまでの間(1期初回終了後、おおむね1年の間隔をおく)	
	9～10歳に達するまでの間	2期1回	9歳以上13歳未満	
二種混合(ジフテリア破傷風)	11～12歳に達するまでの間	1回	11歳以上13歳未満	制限なし
子宮頸がん	(2価)サーバリックス	※3回	小学6年生～高校1年生に相当する年齢の女子 (令和4年4月より積極的勧奨が再開されました)	制限なし
	(4価)ガーダシル			
	(9価)シルガード9			
注1: 次回接種するものが生ワクチン(BCG、水痘、麻しん風しん)を受ける場合は27日以上あける 新型コロナワクチン接種する場合は接種する日の前後13日以上あける。				

●町が実施する予防接種の標準的なスケジュール

丸囲み数字(①、②など)は、ワクチンの種類ごとに接種の回数と、標準的な接種時期の例を示しています。

丸囲み数字間に矢印があるものは、接種間隔を誤りやすいので、特にご注意ください。

塗りつぶし部分以外は、定期接種の対象外です(特例の対象者を除く)。

種類	ワクチン	乳児期												幼児期						学童期～												
		生直後	6週0日後	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	12か月から	15か月から	17か月から	18か月から	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳から						
定期接種	ロタリックス		①	②	24週まで ①は14週6日後までに受けましょう																											
	ロタテック		①	②	③	32週まで ①は14週6日後までに受けましょう																										
	ヒブ(Hib)		①	②	③	7～13月の間隔をあける												④														
	小児用肺炎球菌		①	②	③	60日以上の間隔をあける												④														
	四種混合(DPY-IPV)		①	②	③	12～18月の間隔をあける												④														
	B型肝炎		①	②	139日以上の間隔												③															
	BCG		①																													
	水痘(水ぼうそう)												①		②																	
	麻しん・風しん(MR)												①						②													
	日本脳炎															①	③								④9～12歳(2期)							
	二種混合(DT)																								①11～12歳(2期)							
	子宮頸がん(HPV)																								小学6年生～高校1年生 ①②③							

※詳しくは町ホームページまたは出生時に配布する「予防接種と子どもの健康」でご確認ください。

接種場所

長崎県内医療機関については、長崎県医師会ホームページにてご確認ください。

町内医療機関	岩永医院	松村内科・消化器科	山川医院	山住医院
ワクチン				
ロタ	○			
ヒブ	○			
小児用肺炎球菌	○			○
四種混合	○			○
B型肝炎	○			○
BCG	○			○
水痘	○	○		○
麻しん風しん(MR)	○	○	○	○
日本脳炎	○	○	○	○
二種混合	○	○	○	○
子宮頸がん	○		○	○
インフルエンザ(子ども・任意)	○	○	○	○