

令和8年度 **じょうずに予防接種を受けるために…** **保存版**

予防接種を受ける前の注意

- ① 乳幼児期の予防接種は個人通知をしませんので、計画的に受けてください。
 - ② 母子手帳を必ずご持参ください。（忘れた場合は受けられません。）
 - ③ 対象年齢を過ぎてしまうと、任意の予防接種となり、自己責任・自己負担での接種となります。
 - ④ 「標準的な接種」の受け方で受けるようにしてください。
 - ⑤ 予防接種の受け方についてわからない場合は、役場 保健師（TEL46-1200）までお尋ねください。
- ※場所…県内の各医療機関(一部を除く) また、なるべく本人の状況等を把握したかかりつけ医等で接種してください。
- ※期間…年間を通して受けることができます。必ず事前に予約をして下さい。


定期予防接種の種類

詳細は町が配布した説明書「**予防接種と子どもの健康**」をご確認ください。

種類		標準的な接種	回数	接種できる年齢
RS ウイルス		妊娠 28 週 0 日～36 週 6 日の妊婦	1 回	妊娠 28 週 0 日～36 週 6 日の妊婦
口 タ	ロタリックス（1 価）	生後 2 か月～1 4 週 6 日までの間 （2 7 日以上の間隔）	2 回 経口接種	生後 6 週 0 日～2 4 週 0 日までの間
	ロタテック（5 価）		3 回 経口接種	生後 6 週 0 日～3 2 週 0 日までの間
小児用 肺炎球菌		生後 2 か月～7 か月未満に開始し、 2 回目は生後 1 2 か月まで （2 7 日以上の間隔）	初回 3 回	生後 2 か月～6 0 か月未満 （5 歳未満）
		初回終了後 6 0 日以上の間隔を置いて 生後 1 2 か月～1 5 か月未満	追加 1 回	
五種混合 〔ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ ヒブ〕		生後 2 か月～7 か月未満 （2 0 日～5 6 日までの間隔）	1 期初回 3 回	生後 2 か月～9 0 か月未満 （7 歳 6 か月未満）
		1 期初回接種（3 回）終了後 （6 月～1 8 月までの間隔）	1 期追加 1 回	
B 型肝炎		生後 2 か月～9 か月未満 （2 7 日以上の間隔）	初回 2 回	1 歳未満
		1 回目終了後 1 3 9 日以上	追加 1 回	
BCG		生後 5 か月～8 か月未満	1 回	1 歳未満
水痘		【1 回目】生後 1 2 か月～1 5 か月未満	2 回	生後 1 2 か月～3 6 か月未満 （3 歳未満）
		【2 回目】1 回目接種終了後 6 か月～1 2 か月までの間隔で接種		
麻しん風 しん混合 （MR）		生後 1 2 か月～2 4 か月未満（2 歳未満） のできるだけ早期に接種	1 期 1 回	生後 1 2 か月～2 4 か月未満 （2 歳未満）
		小学校就学前の 1 年間	2 期 1 回	小学校就学前の 1 年間

種類	標準的な接種	回数	接種できる年齢
日本脳炎	3歳～4歳に達するまでの間 (6日～28日までの間隔)	1期初回 2回	生後6か月～90か月未満 (7歳6か月未満)
	4歳～5歳に達するまでの間 (1期初回終了後、おおむね1年の間隔をおく)	1期追加 1回	
	9歳～10歳に達するまでの間	2期1回	9歳以上13歳未満
二種混合 〔ジフテリア 破傷風〕	11歳～12歳に達するまでの間	1回	11歳以上13歳未満
子宮頸がん (9価)	中学1年生の女子 ※15歳未満では、6か月間隔の2回	※3回	小学6年生～高校1年生に相当する年齢の女子

★他の予防接種の間隔



注意1：特に医師が認めた場合、同時接種を受けることができます。

注意2：同一ワクチンを複数回接種する必要がある場合、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守る必要があります。

接種場所

長崎県内医療機関については、長崎県医師会ホームページにてご確認ください。
医療機関に直接電話等で予約後接種してください。

町内医療機関	岩永医院	松村内科・消化器科	山川医院	山住医院
ワクチン				
ロタ	○			
小児用肺炎球菌	○			
五種混合	○	○		
B型肝炎	○	○		
BCG	○	○		
水痘	○	○		○
麻しん風しん(MR)1期	○	○		○
麻しん風しん(MR)2期	○	○	○	○
日本脳炎 I期	○	○		○
日本脳炎 II期	○	○	○	○
二種混合	○	○	○	○
子宮頸がん(9価)	○		○	○
RSウイルス(妊婦)				○
インフルエンザ(子ども・任意)	○	○	○	○