

# じょうずに予防接種を受けるために・・・

## 予防接種を受ける前の注意

- ① 乳幼児期の予防接種は個人通知をしませんので、計画的に受けてください。
  - ② 母子手帳を必ずご持参ください。（忘れた場合は受けられません。）
  - ③ 対象年齢を過ぎてしまうと、任意の予防接種となり、自己責任・自己負担での接種となります。
  - ④ 「標準的な接種」の受け方で受けるようにしてください。
  - ⑤ 予防接種の受け方についてわからない場合は、役場 保健師（Tel46-1200）までお尋ねください。
- ※場所・・・県内の各医療機関（一部を除く） また、なるべく本人の状況等を把握したかかりつけ医等で接種してください。
- ※期間・・・年間を通して受けることができます。必ず事前に予約をして下さい。

## 定期予防接種の種類

詳細は町が配布した説明書「予防接種と子どもの健康」をご確認ください。

- ① または②のどちらかの接種となります。

種類		標準的な接種	回数	接種できる年齢	他の予防接種までの間隔
ロ タ タ	ロタリックス (1価)	生後2か月～14週6日までの間 (27日以上の間隔)	2回 経口接種	生後6週0日～24週0日までの間	制限なし
	ロタテック (5価)	生後2か月～14週6日までの間 (27日以上の間隔)	3回 経口接種	生後6週0日～32週0日までの間	
小児用 肺炎球菌		生後2か月～7か月未満に開始し、2回目は生後12か月まで (27日以上の間隔) 初回終了後60日以上の間隔において生後12か月～15か月未満	初回3回 追加1回	生後2か月～60か月未満 (5歳未満)	制限なし
① 五種混合  (ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ ヒブ)		生後2か月～7か月未満 (20日～56日までの間隔) 1期初回接種(3回)終了後 (6か月～18か月の間隔)	1期初回 3回 1期追加 1回	生後2か月～90か月未満 (7歳6か月未満)	制限なし
② ヒブ		生後2か月～7か月未満に開始し、生後12か月まで (27～56日の間隔) 初回接種終了後7か月～13か月の間隔で接種	初回3回 追加1回	生後2か月～60か月未満 (5歳未満)	制限なし
② 四種混合  (ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ)		生後2か月～12か月未満 (20～56日までの間隔) 1期初回接種(3回)終了後 12か月～18か月の間隔で接種	1期初回 3回 1期追加 1回	生後2か月～90か月未満 (7歳6か月未満)	制限なし
B型肝炎		生後2か月～9か月未満 (27日以上の間隔) 生後2か月～9か月未満 (1回目終了後139日以上)	初回2回 追加1回	1歳未満	制限なし
BCG		生後5か月～8か月未満	1回	1歳未満	注1
水痘		【1回目】生後12か月～15か月未満 【2回目】1回目接種終了後6か月～12か月までの間隔で接種	2回	生後12か月～36か月未満 (3歳未満)	注1

種類	標準的な接種	回数	接種できる年齢	他の予防接種までの間隔
麻しん風しん混合(MR)	生後12か月～24か月未満(2歳未満)	1期1回	生後12か月～24か月未満(2歳未満)	注1
	小学校就学前の1年間	2期1回	小学校就学前の1年間	
日本脳炎	3歳～4歳未満(6日～28日までの間隔)	1期初回 2回	生後6か月～90か月未満(7歳6か月未満)	制限なし
	4歳～5歳に達するまでの間(1期初回終了後、おおむね1年の間隔をおく)	1期追加 1回		
	9歳～10歳に達するまでの間	2期1回	9歳以上13歳未満	
二種混合 (ジフテリア破傷風)	11歳～12歳に達するまでの間	1回	11歳以上13歳未満	制限なし
子宮頸がん	(2価) サーバリックス	※3回	小学6年生～高校1年生に相当する年齢の女子	制限なし
	(4価) ガーダシル			
	(9価) シルガード9			
中学1年生の女子 ※シルガード9は、15歳未満では、6か月間隔の2回				

注1：次回接種するものが生ワクチン（BCG、水痘、麻しん風しん）を受ける場合は27日以上あける

### 接種場所

長崎県内医療機関については、長崎県医師会ホームページにてご確認ください。

町内医療機関	岩永医院	松村内科・消化器科	山川医院	山住医院
ワクチン				
ロタ	○			
ヒブ	○			
小児用肺炎球菌	○			
四種混合	○	○		
五種混合	○	○		
B型肝炎	○	○		
BCG	○	○		
水痘	○	○		○
麻しん風しん(MR)	○	○	○	○
日本脳炎	○	○	○	○
二種混合	○	○	○	○
子宮頸がん	○		○	○
インフルエンザ(子ども・任意)	○	○	○	○